

Nehmen Sie diese Broschüre zu den Arztterminen Ihres Kindes mit.

**Isentress® 100 mg Granulat zur Herstellung einer Suspension
zum Einnehmen**

Wirkstoff: Raltegravir

Herstellungsanleitung

für Babys

**Vergewissern Sie sich, dass Sie die Herstellungsanleitung
gelesen und verstanden haben.**

Zur Vorbereitung

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Arzt Ihnen zeigt, wie Sie die Isentress Suspension zum Einnehmen zubereiten und geben sollen.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie mit der Zubereitung beginnen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, rufen Sie Ihren Arzt an.
- Es ist sehr wichtig, dass Sie das Wasser und Isentress sorgfältig mit der richtigen Spritze abmessen.
- Prüfen Sie das Verfalldatum, bevor Sie Isentress Ihrem Kind geben. Das Verfalldatum ist auf dem Umkarton und auf den Beuteln von Isentress aufgedruckt.

Zur Vorbereitung

- Die Menge von Isentress hängt vom Alter und vom Gewicht Ihres Kindes ab und ändert sich somit über die Zeit.

Ihr Arzt wird Ihnen bei jedem Kontrolltermin erneut die korrekte Dosis nennen, nachdem er Ihr Kind gewogen hat.

Halten Sie daher unbedingt die Kontrolltermine bei Ihrem Arzt ein, damit Sie über die neue Dosierung informiert werden, die dem Wachstum Ihres Kindes über die Zeit angepasst wird.

Während der ersten Lebenswoche Ihres Kindes geben Sie Ihrem Kind Isentress einmal täglich. Danach geben Sie das Arzneimittel Ihrem Kind zweimal täglich.

- Diese Broschüre beschreibt wie Sie:
 - Isentress zu einer Flüssigkeit mischen
 - die korrekte Dosis mit einer Spritze abmessen
 - Isentress Ihrem Kind geben
 - reinigen und entsorgen


Inhalt der Packung

- Umkarton



- Anleitung (diese Broschüre)

- Gebrauchsinformation (Packungsbeilage)




- 2 Mischbecher



- 60 Beutel Isentress Granulat




- 6 Spritzen



2 **blaue** (10 ml) Spritzen



2 **grüne** (3 ml) Spritzen




2 **weiße** (1 ml) Spritzen

Die Packung enthält einen zweiten Mischbecher und einen zweiten Satz Spritzen, falls etwas beschädigt wird oder verloren geht. Verwenden Sie keine beschädigten Mischbecher und keine beschädigten Spritzen.

Schritt 1: Machen Sie sich bereit

- Legen Sie Ihr Kind an einen Platz, wo es sicher ist. Sie benötigen beide Hände zur Zubereitung von Isentress.
- Waschen Sie sich die Hände mit Wasser und Seife.
- Legen Sie sich alles, was Sie zur Zubereitung einer Dosis benötigen, auf einer sauberen Fläche bereit:




1 Mischbecher


(Öffnen Sie den
Deckel, indem Sie ihn
an der Lasche nach oben
ziehen)



1 Beutel
Isentress Granulat



ein sauberes Glas




3 Spritzen

(Halten Sie alle Größen bereit,
auch wenn Sie nur 1 oder 2
brauchen,
je nach der Dosis)


Schritt 2: Füllen Sie ein Glas mit Wasser

Füllen Sie ein sauberes Glas mit Trinkwasser in Raumtemperatur aus dem Wasserhahn oder aus einer Flasche mit stillem Wasser.




Schritt 3: Füllen Sie die blaue Spritze mit Wasser

Drücken Sie den Kolben der **blauen** Spritze soweit wie möglich in die Spritze hinein.





Halten Sie die Spitze der Spritze in das Glas Wasser. Ziehen Sie den Kolben heraus. Ziehen Sie nur bis zur 10-ml-Markierung.



Schritt 4: Prüfen Sie auf Luftblasen


Halten Sie die Spritze mit der Spitze nach oben.
Klopfen Sie mit dem Finger daran, um
Luftblasen nach oben zu
bewegen.

Drücken Sie den Kolben langsam
nach oben, um die Luft herauszudrücken.



Prüfen Sie nochmals die
Wassermenge in der Spritze.
Wenn sie unter 10 ml ist,
tauchen Sie die Spitze wieder
in das Wasser und ziehen den
Kolben wieder zurück, bis Sie
wieder die 10-ml-Markierung
erreichen.

Schritt 5: Geben Sie die 10 ml Wasser in den Mischbecher




Schritt 6: Geben Sie Isentress ebenfalls in den Mischbecher

Anmerkung bevor Sie Isentress hinzugeben:


Sie und Ihr Kind sollten bereit sein! Sie sollten Isentress nach dem Vermischen innerhalb von 30 Minuten anwenden!

Nachdem Sie Ihrem Kind seine Dosis Isentress gegeben haben, werfen Sie bitte die Restmenge weg.



Nehmen Sie 1 Beutel Isentress und schütteln Sie das Granulat auf den Boden des Beutels.

Reißen oder schneiden Sie den Beutel auf und geben Sie das gesamte Granulat in den Mischbecher zum Wasser. Prüfen Sie, dass der Beutel komplett leer ist.




Schritt 7: Vermischen Sie Isentress und das Wasser

Schließen Sie den Mischbecher mit dem Deckel, so dass dieser einrastet.

Schwenken Sie den Mischbecher vorsichtig 45 Sekunden in einer Drehbewegung, um Granulat und Wasser zu vermischen.

Verwenden Sie eine Uhr oder Stoppuhr, um die Bewegung nach 45 Sekunden zu beenden.

Die Mischung **NICHT SCHÜTTELN!**



Überprüfen Sie, ob das Granulat vermischt wurde.

Wenn nicht, schwenken Sie den Becher noch etwas.

Die Mischung sollte etwas trüb aussehen.

Schritt 8: Überprüfen Sie die verordnete Dosis

Verwenden Sie für die Dosis die Menge, die in Milliliter „ml“ von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Denken Sie daran, dass sich die Dosis bei jedem Arztbesuch ändern kann, so dass Sie sicher sein sollten, die neueste Verordnung zu verwenden. Halten Sie alle Arzttermine ein, damit Ihr Kind jederzeit die korrekte Dosis erhält!

Schritt 9: Wählen Sie die benötigte(n) Spritze(n)


Wählen Sie die richtige Spritze für die Dosis Ihres Kindes:

WEISS
(1 ml)
für 1 ml
oder weniger


Bewegen Sie diesen Teil des Kolbens
(siehe Pfeil) wie auf dem Bild oben gezeigt
zur richtigen Markierung auf der Spritze



GRÜN
(3 ml)
für 1,5 ml
bis 3 ml



BLAU
(10 ml)
für 3,5 ml
bis 10 ml




Finden Sie dann die Milliliter „ml“-(oder auch „mL“)-Markierung am Spritzenzylinder, die der Dosierung Ihres Kindes entspricht.

Schritt 10: Messen Sie Isentress ab

Drücken Sie den Kolben soweit wie möglich in den Zylinder der Spritze.



Halten Sie die Spitze der Spritze in den Mischbecher mit dem vermischten Isentress und ziehen Sie den Kolben zurück.



Ziehen Sie nur bis zu der Markierung zurück, die der Dosis entspricht, die Ihrem Kind verordnet wurde.



WICHTIG:

- Die Dosis Ihres Kindes wird möglicherweise nicht der abgebildeten entsprechen.
- Normalerweise wird eine Restmenge im Mischbecher übrigbleiben.

Schritt 11: Prüfen Sie auf Luftblasen

Halten Sie die Spritze mit der Spitze nach oben.
Klopfen Sie mit dem Finger daran, um Luftblasen nach oben zu bewegen.


Drücken Sie den Kolben langsam nach oben, um die Luft herauszudrücken.



Überprüfen Sie nochmals die Menge Isentress in der Spritze.
Falls weniger als die verordnete Dosis enthalten ist, führen Sie die Spitze der Spritze nochmals in den Becher mit der zubereiteten Isentress Mischung und ziehen den Kolben erneut bis zur richtigen Dosismarkierung zurück.

Schritt 12: Geben Sie Isentress Ihrem Kind

Führen Sie die Spitze der Spritze so in den Mund Ihres Kindes, dass diese entweder die rechte oder linke Wange berührt.



Drücken Sie langsam den Kolben herunter, um die zubereitete Isentress Mischung zu geben. Sollte Ihr Kind Schwierigkeiten machen, nehmen Sie die Spritze heraus und versuchen es erneut. Es ist sehr wichtig, dass Ihr Kind die gesamte verordnete Dosis erhält (eine kleine Restmenge in der Spitze der Spritze ist in Ordnung).

WICHTIG: Wenn Ihr Kind nicht die gesamte verordnete Dosis einnimmt oder einen Teil davon wieder ausspuckt, rufen Sie bitte Ihren Arzt an, um nachzufragen, was Sie tun können.

Schritt 13: Reinigung und Entsorgung

Geben Sie die verbleibende Restmenge Isentress in den Haushaltsabfall.


Geben Sie diese nicht in das Abwasser.

Entfernen Sie die Kolben aller Spritzen, die Sie benutzt haben.

Waschen Sie Spritzen, Kolben und Mischbecher mit warmem Wasser und Spülmittel mit der Hand. Verwenden Sie keine Spülmaschine.

Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie alles an der Luft trocknen.

Bewahren Sie alles sauber und trocken auf.



Wie ist Isentress aufzubewahren?

Die Beutel in der Originalverpackung aufbewahren, um das Arzneimittel vor Feuchtigkeit zu schützen.

Öffnen Sie die Isentress Beutel erst unmittelbar vor der Zubereitung.

Halten Sie unbedingt die Arzttermine ein, um jederzeit zu wissen, wie viel Isentress Sie Ihrem Kind geben sollen!



7005405601