WICHTIG: Lesen Sie vor der Anwendung diese Broschüre.

DE

Gebrauchsanweisung

WINREVAIR® Sotatercept

45 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Packung mit 2 Durchstechflaschen)
60 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Packung mit 2 Durchstechflaschen)

Diese Broschüre enthält Anweisungen zur Zubereitung und Injektion von Winrevair Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung. Die ebenfalls in der Packung enthaltene Packungsbeilage (Gebrauchsinformation) enthält alle wichtigen Informationen für Sie.

Die Dosierung beruht auf dem Körpergewicht des Patienten
Nur zur subkutanen (s.c.) Injektion (Injektion direkt unter die Haut)

Wichtig
Anmischen
Kombination
Entnahme
Injektion

In dieser Broschüre:

Wichtige Informationen für das medizinische Fachpersonal 3
Bevor Sie beginnen 4
Lernen Sie die Bestandteile Ihres Sets kennen 6
Wichtige Informationen vor der Injektion 8
Aufbewahrung Ihrer Packung 9

Beginn 10
Anmischen des pulverförmigen Arzneimittels in eine flüssige Form 12
Kombination des Arzneimittels aus beiden Durchstechflaschen . . . 24
Entnahme der verordneten Dosis 30
Injektion des Arzneimittels 36

Wie Sie Winrevair entsorgen 38
Häufig gestellte Fragen 40

70122520/00-1

Wichtig

Wichtige Informationen für das medizinische Fachpersonal

Das medizinische Fachpersonal wird Sie in die richtige Zubereitung und Anwendung von Winrevair einweisen, indem es Ihnen mittels dieser Broschüre Schritt für Schritt die „Gebrauchsanweisung“ erklärt und entscheidet, ob ein Patient oder eine Pflegekraft in der Lage ist, Winrevair selbständig zuzubereiten und anzuwenden.

Stellen Sie sicher, dass der Patient oder die Pflegekraft Folgendes richtig durchführen kann:

1. Arzneimittel rekonstituieren
2. Arzneimittel aus beiden Durchstechflaschen kombinieren
3. Richtige Menge an Arzneimittel abmessen entsprechend der Verschreibung für den Patienten
4. Passende Injektionsstelle auswählen und vorbereiten
5. Arzneimittel subkutan injizieren

Bevor Sie beginnen

Lesen Sie diese Broschüre
Lesen Sie diese Anweisung vollständig durch, bevor Sie Winrevair zum ersten Mal anwenden sowie vor jeder Anwendung. Möglicherweise gibt es neue Informationen.

Beginnen Sie zusammen mit Ihrem Arzt oder Ihrem medizinischen Fachpersonal
Wenden Sie Winrevair erst an, wenn Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal Ihnen oder Ihrer Pflegekraft gezeigt hat, wie es richtig zubereitet und injiziert wird. Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal sollten Ihnen zeigen, wie Sie Winrevair injizieren, bevor Sie es zum ersten Mal anwenden.

Fragen?
Wenn Sie Fragen zur richtigen Anwendung von Winrevair haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

70122520/00-1

Wichtig

? Wie ist dieses Produkt anzuwenden?

Stellen Sie vor der Injektion sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisungsbroschüre vollständig gelesen haben, um die richtige Dosis des Arzneimittels zu erhalten.

- Arzneimittel in der Durchstechflasche 1 **anmischen**
- Arzneimittel in der Durchstechflasche 2 **anmischen**
- Arzneimittelmischung von Durchstechflasche 1 mit Durchstechflasche 2 **kombinieren**
- Verordnete Dosis aus Durchstechflasche 2 **entnehmen**
- Dann sind Sie bereit, Ihr Arzneimittel zu **injizieren**

Fahren Sie mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf den nächsten Seiten fort.

Lernen Sie die Bestandteile Ihres Sets kennen

Oberes Fach: Utensilien zur **Zubereitung** des Arzneimittels



A **2 Durchstechflaschen** mit Winrevair **Arzneimittelpulver**

B **2 Fertigspritzen (Lösungsmittel)** mit **sterilem Wasser** zum Anmischen des Arzneimittelpulvers in eine flüssige Form

C **2 Durchstechflaschen-Adapter** zum Verbinden von Durchstechflasche und Spritze

70122520/00-1

Unteres Fach: Utensilien zur **Injektion** des Arzneimittels



D

1 Kanüle zur Injektion

E

1 Leere Dosierspritze zur Abmessung, Entnahme und Injektion des Arzneimittels

F



8 Alkoholtupfer
(4 in jedem Fach)

Wichtige Informationen vor der Injektion

- Dieses Arzneimittel ist vor der Anwendung anzumischen. Stellen Sie sicher, dass das Arzneimittelpulver in der Durchstechflasche zum Zeitpunkt der Injektion vollständig aufgelöst ist.
- **Überprüfen Sie die verordnete Dosis (Menge in „ml“) bei jeder Anwendung des Arzneimittels. Die verordnete Dosis kann sich ändern.**
- Verwenden Sie zur Zubereitung der verordneten Dosis nur die im Set enthaltenen Verbrauchsmaterialien.
- Öffnen Sie die Packung nicht oder mischen Sie das Arzneimittel erst an, wenn Sie bereit sind, es anzuwenden.
- **Verwenden Sie keines der Verbrauchsmaterialen erneut.** Entsorgen Sie nicht verwendetes Arzneimittel und verwendete Verbrauchsmaterialien entsprechend den nationalen Anforderungen. Siehe Seiten 38 – 39 für weitere Informationen.

70122520/00-1

Wichtig

Aufbewahrung Ihrer Packung

- Gesamte Packung im Kühlschrank lagern, jedoch nicht einfrieren.
- Das Arzneimittel und die Verbrauchsmaterialien in der Packung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
- Packung für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.

Beginn

Jeder Patient oder jede Pflegekraft, der/die Winrevair zubereiten und injizieren soll, muss zunächst vom medizinischen Fachpersonal geschult und als fähig erachtet werden, Winrevair selbstständig anwenden zu können.

1 Überprüfen Sie das Winrevair Produkt und das Verfallsdatum

Winrevair Packung aus dem Kühlschrank entnehmen.

✓ **Verfallsdatum überprüfen und auf Anzeichen von Beschädigungen** an der Packung oder den Verbrauchsmaterialien achten.

⚠ Nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum des Arzneimittels überschritten ist, oder es beschädigt ist. Umgehend mit Ihrem Arzt oder Apotheker sprechen, um eine neue Packung zu erhalten.

✓ **Überprüfen, ob es das Arzneimittel ist,** das der Arzt verordnet hat.

Wichtig

2 Lassen Sie die Packung Raumtemperatur annehmen, stellen Sie die Verbrauchsmaterialien bereit und waschen Sie die Hände

15 Minuten abwarten, damit die Packung Raumtemperatur annehmen kann.

Eine kalte Arzneimittel-Lösung ist beim Injizieren schmerzhafter.

15 Minuten

Neben den Verbrauchsmaterialien aus Ihrer Packung folgende Gegenstände bereithalten und eine saubere, ebene Oberfläche vorbereiten, auf der Sie die Dosis zubereiten und injizieren.

durchstichsicherer Behälter

Gaze, Wattebausch oder Verband

Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser.

Anmischen des pulverförmigen Arzneimittels in eine flüssige Form

Mit dem oberen Fach beginnen



⚠ Verwenden Sie die Verbrauchsmaterialien aus dem **oberen Fach**

3 **Entnehmen Sie Durchstech-flasche 1, Fertigspritze 1 und Durchstechflaschen-Adapter 1 aus der Packung**



70122520/00-1

Anmischen

4a Überprüfen Sie die Durchstechflasche mit dem Arzneimittel



- Nicht beschädigt?
- Keine sichtbaren kleinen Teilchen?
- Verfallsdatum nicht überschritten?

Etikett der Durchstechflasche überprüfen, um sicherzustellen, **dass das Verfallsdatum nicht überschritten ist.**

Arzneimittelpulver durch Sichtkontrolle überprüfen. Es sollte weiß bis cremefarben sein und kann in Form eines unversehrten Pulverkuchens oder in Bruchstücken vorliegen.

⚠ Nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum überschritten ist, eine Beschädigung vorliegt oder wenn kleine Teilchen sichtbar sind.

4b Entfernen Sie die Kunststoffkappe und reinigen Sie die Durchstechflasche



Kunststoffkappe entfernen und **den Gummistopfen oben auf der Durchstechflasche** mit einem Alkoholtupfer **reinigen.**

⚠ Nicht verwenden, wenn die Kappe fehlt
⚠ Den gereinigten Gummistopfen nicht berühren

Durchstechflasche auf einer sauberen, ebenen Oberfläche beiseitestellen.

5a Bringen Sie den Durchstechflaschen-Adapter an der Durchstechflasche an



Verpackung des Durchstechflaschen-Adapters öffnen und ihn aus der Verpackung entnehmen.

Den blauen Hals des Durchstechflaschen-Adapters halten

Aufsetzen des Durchstechflaschen-Adapters:



Den blauen Hals des Durchstechflaschen-Adapters halten und den Adapter oben auf die Durchstechflasche aufsetzen.

⚠ Nicht die Innenseite des Durchstechflaschen-Adapters berühren, um ihn sauber zu halten und Stichverletzungen zu vermeiden.

5b Setzen Sie den Durchstechflaschen-Adapter auf die Durchstechflasche



Die Durchstechflasche mit einer Hand festhalten. Den **Durchstechflaschen-Adapter fest nach unten drücken,** bis er einrastet (möglicherweise spüren Sie einen Widerstand).

5c Reinigen Sie den Durchstechflaschen-Adapter



Den oberen Teil des Durchstechflaschen-Adapters mit einem Alkoholtupfer reinigen.

6 Überprüfen Sie die Fertigspritze

Vergewissern Sie sich, dass das Verfallsdatum des Arzneimittels nicht überschritten ist. Das sterile Wasser in der Fertigspritze durch Sichtkontrolle auf Klarheit überprüfen.

- ✓ Nicht beschädigt?
- ✓ Klar?
- ✓ Keine kleinen Teilchen?
- ✓ Verfallsdatum nicht überschritten?



Verfallsdatum

⚠ Nicht anwenden, wenn Klumpen, Partikel oder Verfärbungen zu sehen sind oder das Verfallsdatum des Arzneimittels überschritten ist.

7 Brechen Sie die weiße Schutzkappe der Fertigspritze ab

Die Schutzkappe der Fertigspritze entlang der Trennlinie abbrechen.

Abbrechen!



⚠ Die Spitze der Fertigspritze nicht berühren.

⚠ Nicht auf den Kolben drücken, da sonst das sterile Wasser austreten kann.

70122520/00-1

8 Setzen Sie die Fertigspritze auf den Durchstechflaschen-Adapter

Anmischen

Jetzt die Arzneimittel-Durchstechflasche mit dem aufgesetzten Adapter nehmen.
Die Spitze der Fertigspritze auf den blauen Kreis des Durchstechflaschen-Adapters ausrichten.

Die Fertigspritze auf den Durchstechflaschen-Adapter drücken und drehen, bis sie nicht mehr weiter drehbar ist. Beim Drehen darauf achten, den Durchstechflaschen-Adapter festzuhalten.

Drücken und dann drehen,
bis sie fixiert ist

⚠ Nicht auf den Kolben drücken, da sonst das sterile Wasser austreten kann

Durchstechflaschen-Adapter halten

9 Überführen Sie das sterile Wasser aus der Fertigspritze in die Durchstechflasche



Den Kolben *langsam* ganz nach unten drücken, um das gesamte sterile Wasser in die Durchstechflasche zu überführen (der Kolben wird sich nach oben bewegen; das ist normal).



Die Fertigspritze auf der Durchstechflasche aufgesetzt lassen und auf einer ebenen Oberfläche beiseitestellen.

10 Bereiten Sie Durchstechflasche 2, Fertigspritze 2 und Durchstechflaschen-Adapter 2 vor

Durchstechflasche 2, Fertigspritze 2 und Durchstechflaschen-Adapter 2 aus der Packung entnehmen.



⚠ Wichtig:

Zu Seite 13 zurückgehen und die Schritte **4** bis **9** wiederholen, um **Durchstechflasche 2 vorzubereiten.**

Durchstech-flasche 1

Durchstech-flasche 2

Anhalten und überprüfen, ob Sie beide Durchstechflaschen vorbereitet haben.
Sie brauchen beide vorbereiteten Durchstechflaschen, bevor Sie mit Schritt 11 fortfahren.

11 Schwenken Sie, um das Arzneimittelpulver aufzulösen



⚠ Durchstechflaschen nicht schütteln.

Mit jeder Hand eine Fertigspritze halten und **beide Durchstechflaschen *vorsichtig* in einer kreisenden Bewegung schwenken,** bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Dies kann bis zu **2 Minuten** dauern. **Nicht schütteln oder heftig bewegen.**



Wenn sich das Arzneimittel gut aufgelöst hat, sollte die Lösung klar sein. Wenn nicht, diesen Schritt wiederholen, bis sie klar ist.



Für jede Durchstechflasche **den Kolben** wieder **nach unten drücken,** um sicherzustellen, dass sich die gesamte Flüssigkeit in der Durchstechflasche befindet, da etwas Flüssigkeit zurück in die Spritze gelangt sein könnte (der Kolben wird sich nach oben bewegen; das ist normal).

70122520/00-1

12 Warten Sie, bis die Bläschen verschwinden



3 Minuten

Beide Durchstechflaschen beiseitestellen, bis sich die Bläschen aufgelöst haben.
Dies kann bis zu 3 Minuten dauern.

⚠ Bevor Sie fortfahren, stellen Sie für das Arzneimittel in der Durchstechflasche sicher, dass es:

- ✓ klar bis opaleszierend und farblos bis leicht bräunlich-gelb ist
- ✓ keine Klumpen oder Pulver enthält
- ✓ keine großen Bläschen enthält

Es ist in Ordnung, wenn sich an den Rändern der Ampulle etwas Schaum (kleine Bläschen) bildet.

13 Bereiten Sie die Durchstechflasche durch Entfernung der überschüssigen Luft vor



Mit einer der Durchstechflaschen beginnen. Während die Durchstechflasche aufrecht ausgerichtet ist, **den Kolben *vorsichtig* nach oben** zum oberen Ende des Zylinders ziehen, wobei aber darauf zu achten ist, den Kolben nicht aus der Spritze zu ziehen.

Tipp: Dieser Schritt zieht nur überschüssige Luft aus der Durchstechflasche, um den Druck in der Durchstechflasche zu verringern und zu verhindern, dass das Arzneimittel beim Entfernen der Spritze austritt.

⚠ Wichtig:

Führen Sie diesen Schritt für **beide** Durchstechflaschen aus. Halten Sie an und überprüfen Sie, ob Sie **beide** Durchstechflaschen vorbereitet haben, bevor Sie fortfahren.

14 Entfernen Sie die Fertigspritze von der Durchstechflasche



Die Durchstechflaschen-Adapter festhalten und **beide** Fertigspritzen von den Durchstechflaschen abschrauben.

Beide Fertigspritzen in einem durchstichsicheren Behälter entsorgen.



Sie sollten zwei Arzneimittel-Durchstechflaschen vorbereitet haben, die bereit sind, in den nächsten Schritten kombiniert zu werden.

Kombination des Arzneimittels aus beiden Durchstechflaschen

Für die nächsten Schritte brauchen Sie:
- die angemischte Arzneimittel-Durchstechflasche 1 und -Durchstechflasche 2
- die Verbrauchsmaterialien aus dem unteren Fach



⚠ Verwenden Sie die Verbrauchs-materialien aus dem **unteren Fach**

15 Reinigen Sie die Oberseiten beider Durchstechflaschen-Adapter

Mit zwei neuen Alkoholtupfern aus dem unteren Fach den oberen Teil der Durchstechflaschen-Adapter reinigen.



16 Entnehmen Sie die leere Dosierspritze aus ihrer Verpackung

Die leere Dosierspritze ist im unteren Fach zu finden und aus ihrer Verpackung zu entnehmen.

Diese Dosierspritze dient zur Abmessung der benötigten Arzneimittelmenge (beruhend auf der verordneten Dosis).



17 Ziehen Sie Luft in die Dosierspritze auf

⚠ Damit stellen Sie sicher, dass der Druck in der Durchstechflasche gleichmäßig ist und Sie eine genaue Dosis erhalten.

Die Dosierspritze aufrecht halten und den Kolben nach unten ziehen, um **1,5 ml Luft in die Dosierspritze aufzuziehen.**



Oberer Rand des Kolbens

Kolben so weit nach unten ziehen, bis der obere Rand des Kolbens die Markierung bei 1,5 ml erreicht.

Tipp: Jeder Strich auf der Dosierspritze entspricht 0,1 ml.

70122520/00-1

18 Verbinden Sie die Dosierspritze mit der Durchstechflasche

Während der Durchstechflaschen-Adapter festgehalten wird, wird die Dosierspritze bis zum Anschlag aufgeschraubt.



19 Drücken Sie die Luft in die Durchstechflasche, wenden Sie sie dann nach oben

Den Kolben ganz nach unten drücken, um die gesamte Luft in die Durchstechflasche zu überführen.

Dann mit Ihrem Daumen **den Kolben in dieser Stellung festhalten** und die Durchstechflasche nach oben wenden.



20 Ziehen Sie das gesamte Arzneimittel aus der ersten Durchstechflasche auf

Langsam den Kolben zurückziehen. **Bei 1,5 ml anhalten.**

Dies stellt sicher, dass sich das gesamte Arzneimittel in der Dosierspritze befindet.



⚠ Ziehen sie den Kolben nicht über 1,5 ml hinaus heraus. **Halten Sie bei 1,5 ml an.**

⚠ Geben Sie acht, den Kolben nicht aus der Dosierspritze heraus zu ziehen.

21 Entfernen Sie die Dosierspritze von der Durchstechflasche 1

Den Durchstechflaschen-Adapter festhalten und die gefüllte Dosierspritze von der Durchstechflasche abschrauben. Die **leere** Durchstechflasche in einem durchstichsicheren Behälter entsorgen.

70122520/00-1

22 Verbinden Sie die Dosierspritze mit der zweiten Durchstechflasche

Während der Durchstechflaschen-Adapter der zweiten Durchstechflasche festgehalten wird, die teilweise gefüllte Dosierspritze auf den Durchstechflaschen-Adapter bis zum Anschlag aufschrauben.

⚠ Kolben nicht berühren; dies kann das Arzneimittel herausdrücken



23 Drücken Sie die gesamte Menge an Arzneimittel in die zweite Durchstechflasche, wenden Sie sie nach oben

Drücken Sie den Kolben *langsam* ganz nach unten, um **das gesamte Arzneimittel in die Durchstechflasche** zu überführen, um die Dosisgenauigkeit sicherzustellen. Dadurch wird das Arzneimittel aus beiden Durchstechflaschen kombiniert.
Halten Sie dann mit Ihrem Daumen **den Kolben in dieser Stellung fest** und wenden Sie die Durchstechflasche nach oben.



Entnehmen Sie Ihre verordnete Dosis

24 Ziehen Sie den Kolben zur Entnahme der Dosis zurück

Während Durchstechflasche und Dosierspritze nach oben gerichtet sind, ziehen **Sie den Kolben langsam zurück.**

Anhalten, wenn die **verordnete Menge in „ml“** erreicht ist.



⚠ **Oberer Rand des Kolbens** sollte der **verordneten Dosis** entsprechen.

Tipp: Jeder Strich auf der Dosierspritze entspricht 0,1 ml.

25 Überprüfen Sie auf Luftbläschen und Lufteinschlüsse

Überprüfen Sie, ob sich große Luftbläschen oder Lufteinschlüsse in der Spritze befinden. Sie werden in den nächsten Schritten überschüssige Luft entfernen.



70122520/00-1

26 Entfernen Sie Luftbläschen und Lufteinschlüsse

Wenn Sie Luftbläschen oder Lufteinschlüsse sehen, an die Seite der Dosierspritze klopfen, um die Luft nach oben zu befördern.

Den Kolben *langsam* nach oben schieben, um die überschüssige Luft zu entfernen.



27 Gleichen Sie die Menge mit der verordneten Dosis ab

Nachdem die gesamte überschüssige Luft entfernt wurde, ist **die Menge mit der verordneten Dosis abzugleichen.**

Wenn Sie nicht die verordnete Menge in der Spritze haben, ziehen Sie den Kolben *langsam* wieder zurück, um mehr Arzneimittel aufzuziehen.

Schritte 24 bis 26 wiederholen, bis **die verordnete Dosis** erreicht ist und keine großen Blasen mehr sichtbar sind.

28 Stellen Sie die verordnete Dosis sicher

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass sich die verordnete Dosis in der Dosierspritze befindet.

Der obere Rand des Kolbens sollte **der verordneten Dosis** entsprechen.

⚠ **Wenn die Menge nicht der verordneten Dosis entspricht, wiederholen Sie die Schritte 24 bis 27.**

29 Entfernen Sie die Dosierspritze von der Durchstechflasche und legen Sie die Dosierspritze beiseite



Den Kolben mit einer Hand in Stellung halten. Mit der anderen Hand den Durchstechflaschen-Adapter festhalten und die befüllte Dosierspritze von der Durchstechflasche abschrauben.

Die Durchstechflasche in einem durchstichsicheren Behälter entsorgen.



Die befüllte Dosierspritze auf einer sauberen, ebenen Oberfläche ablegen.

⚠ Die Spitze der Dosierspritze nicht berühren oder den Kontakt mit einer Oberfläche vermeiden.

30 Setzen Sie die Kanüle auf

⚠ Verbindungsnabe der Kanüle nicht berühren



Die Kanüle dem unteren Fach entnehmen und die Verpackung öffnen.



Während sich die Kanüle noch in der Verpackung befindet, **die Basis der Kanüle fassen** und **sie auf die Dosierspritze** bis zum Anschlag aufschrauben. Die Verpackung der Kanüle entfernen.

Den Sicherheitsschutz von der Kanüle entfernen und in Richtung der Spritze in dem angezeigten Winkel ziehen. Die Dosierspritze auf eine saubere, ebene Oberfläche ablegen.

⚠ Die Schutzkappe nicht entfernen

31 Suchen Sie die Injektionsstelle aus und reinigen Sie sie



Eine Injektionsstelle an Ihrem Bauch (Abdomen) oder Oberschenkel **auswählen.** Beim Injizieren im Bauchbereich, den Bereich 5 cm um den Bauchnabel vermeiden.

Bei jedem erneuten Injizieren ist eine neue Stelle auszuwählen:

- ⚠ Nicht in geschädigte, wunde Haut oder Haut mit Blutergüssen oder Stellen mit roten Flecken injizieren.
- ⚠ Nicht durch Kleidungsstücke injizieren.

Die Injektionsstelle mit einem neuen Alkoholtupfer reinigen.

- ⚠ Die gereinigte Injektionsstelle nicht mehr berühren.

Nun sind Sie für die Injektion des Arzneimittels bereit.

Entnahme

Injektion des Arzneimittels

32 Injizieren Sie das Arzneimittel



Schutzkappe gerade von der Kanüle abziehen.
Schutzkappe entsorgen.

⚠ Den Kolben nicht berühren, bevor Sie für die Injektion bereit sind, damit kein Arzneimittel austritt.



Drücken Sie die Haut sanft **zusammen und bilden Sie dort eine Hautfalte,** wo Sie injizieren werden. Die Kanüle **mit einer gezielten Bewegung im Winkel von 45° bis 90°** in die Haut einstechen. Dies hilft Ihnen, direkt unter die Haut (subkutane Injektion) einzuspritzen.



Den Kolben langsam mit gleichmäßigem Druck ganz **nach unten drücken,** bis die Dosierspritze entleert ist. **Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Arzneimittel injiziert wurde.**
Sie können die Hautfalte nun loslassen.

70122520/00-1

⚠ Mit den Fingern zu jedem Zeitpunkt von der Kanüle Abstand halten.



Mit gedrücktem Kolben **die Kanüle** mit demselben Winkel wie beim Einstich **aus der Haut herausziehen.**



Um den Kanülenschutz wieder aufzusetzen, diesen an eine ebene Oberfläche drücken, bis Sie ein „Klicken“ hören und sehen, dass die Kanüle bedeckt ist.

Die Dosierspritze und benutztes Material in einem durchstichsicheren Behälter entsorgen.

⚠ Die Kanüle nicht von der Dosierspritze entfernen

Wie Sie Winrevair entsorgen

Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Sie Arzneimittel entsorgen, die Sie nicht mehr verwenden. Diese Maßnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei. Stellen Sie sicher, dass Sie die lokalen Entsorgungsvorgaben einhalten, da diese von den unten aufgeführten allgemeinen Empfehlungen abweichen können.

- Entsorgen Sie alle verwendeten Durchstechflaschen (einschließlich jeglicher Reste des aufgelösten Winrevair), Kanülen, Durchstechflaschen- und Kanülen-Kappen sowie verwendete Spritzen in einem durchstichsicheren Behälter.
- Entsorgen Sie die Winrevair Durchstechflaschen, Spritzen oder Kanülen nicht im Hausmüll.
- **Verwenden Sie keines der Verbrauchsmaterialien erneut.** Dies ist ein Einwegartikel und ist nur zur Einmalanwendung bestimmt.
- **Wichtig:** Bewahren Sie den durchstichsicheren Behälter stets für Kinder und Haustiere unzugänglich auf.

Wenn Sie keinen durchstichsicheren Behälter haben, können Sie einen Haushaltsbehälter verwenden, der:

- aus strapazierfähigem Kunststoff hergestellt ist,
- mit einem festsitzenden, durchstichsicheren Deckel verschlossen werden kann, so dass ihn spitze Gegenstände nicht durchstechen können,
- während der Verwendung aufrecht und stabil steht,
- auslaufsicher ist und
- entsprechend gekennzeichnet ist, um vor dem gefährlichen Abfall im Inneren des Behälters zu warnen.

Wenn Ihr Behälter fast voll ist, müssen Sie den lokalen Vorgaben folgen, um Ihren Behälter richtig zu entsorgen.

⚠ Verwenden Sie Ihren Behälter nicht erneut.

Häufig gestellte Fragen

Was soll ich tun, wenn meine Injektionsstelle blutet?
Legen Sie umgehend einen Wattetupfer oder ein Pflaster auf die Haut und üben Sie leichten Druck aus. Wenn die Blutung nicht aufhört, kontaktieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Apotheker.

Wo finde ich meine verordnete Dosis?
Die Ihnen verordnete Dosis in „ml“ finden Sie auf Ihrem Rezept. Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie die Ihnen verordnete Dosis nicht finden können.

Was soll ich tun, wenn ich das Arzneimittel versehentlich auf die Haut oder die Arbeitsfläche bekommen habe?
Waschen Sie den Bereich umgehend gründlich mit Seife und Wasser.

Was soll ich tun, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich die verordnete Dosis richtig angewendet habe?
Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

70122520/00-1

Was soll ich tun, wenn sich der Kolben meiner Dosierspritze von allein bewegt, wenn ich versuche, Arzneimittel aus der Durchstechflasche zu entnehmen?

Es besteht kein Grund zur Sorge, wenn sich der Kolben leicht von allein bewegt, wenn Sie die Dosierspritze mit dem Arzneimittel befüllen.

Halten Sie den Kolben mit einer Hand **fest in Stellung, um zu verhindern, dass er sich bewegt.** Schrauben Sie mit der anderen Hand die Durchstechflasche von der Dosierspritze ab. Sobald sie abgeschraubt ist, können Sie den Kolben unbesorgt loslassen.

Sie können das automatische Bewegen des Kolbens vermeiden, indem Sie Luft in die Durchstechflasche drücken, bevor Sie Ihre Dosierspritze mit dem Arzneimittel befüllen. Für eine detaillierte Beschreibung siehe Schritte 17 bis 28.

Was soll ich tun, wenn Bestandteile meines Sets beschädigt oder verändert sind (zum Beispiel verfärbt, trüb oder mit Partikeln)?

Wenn Bestandteile Ihres Sets beschädigt oder verändert sind, verwenden Sie diese bitte nicht. Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, um eine neue Packung zu erhalten.

Was soll ich tun, wenn mein Arzneimittel nach dem Anmischen und Schwenken nicht klar wird?

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht, wenn Sie die Arzneimittel-Durchstechflasche für etwa 2 Minuten geschwenkt haben und es anschließend für weitere 3 Minuten stehen gelassen haben, aber das Arzneimittel dennoch trüb bleibt oder Klumpen, Pulver oder Fremdpartikel enthält. Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, um eine neue Packung zu erhalten.

Was soll ich tun, wenn sich das sterile Wasser nicht aus der Fertigspritze entnehmen lässt?

Überprüfen Sie, ob der Durchstechflaschen-Adapter fest auf der Durchstechflasche angebracht ist. Falls nicht, halten Sie die Durchstechflasche fest und drücken Sie den Durchstechflaschen-Adapter fest nach unten, um sicherzustellen, dass der Durchstechflaschen-Adapter den Durchstechflaschen-Gummistopfen durchsticht.

Was soll ich tun, wenn Bestandteile des Sets heruntergefallen sind?

Verwenden Sie keine beschädigten Verbrauchsmaterialien. Wenn Sie sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, um eine neue Packung zu erhalten.

70122520/00-1

Kann ich mein Set verwenden, wenn es außerhalb des Kühlschranks gelagert wurde?

Wenn das unbenutzte Injektionsset für längere Zeit nicht im Kühlschrank gelagert wurde, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie fortfahren.

Muss ich das zubereitete Arzneimittel sofort anwenden?

Wir empfehlen, das Arzneimittel direkt nach der Zubereitung, jedoch nicht später als 4 Stunden nach dem Anmischen, zu injizieren. Wenn mehr als 4 Stunden vergangen sind, entsorgen Sie nicht verwendetes zubereitetes Arzneimittel. Wenn Sie Fragen haben oder bei der Vorgehensweise unsicher sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Wo kann ich Hilfe beim Zubereiten und Verabreichen meiner Injektion erhalten?

Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Sie Winrevair richtig anwenden, oder Sie weitere Informationen benötigen, können Sie Ihren Arzt oder Apotheker fragen.

Für weitere Informationen zu diesem Arzneimittel wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker oder an den örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers. Die Kontaktdaten des örtlichen Vertreters finden Sie in der Gebrauchsinformation: Information für Patienten.

Diese Broschüre wurde zuletzt überarbeitet im März 2025