

Брошюра для выдачи лечащими врачами пациентам, проходящим терапию препаратом КЕЙТРУДА®

КЕЙТРУДА® – это препарат для лечения онкологических заболеваний, относящийся к новым методам иммунотерапии. Такие лекарственные препараты могут содействовать собственной иммунной системе организма благодаря тому, что они могут усиливать уже имеющуюся способность иммунной системы бороться с раковыми клетками.

Мы желаем вам всего наилучшего!

Baш коллектив MSD



Информация о рисках и побочных эффектах содержится в листке-вкладыше. Также вы можете получить ее у своего врача или сотрудника аптеки.

Если вы обнаружили побочные эффекты, обратитесь к своему врачу. Это также относится к тем побочным эффектам, которые не указаны в листке-вкладыше по применению препарата.

Содержание

Введение	4
Как действует препарат КЕЙТРУДА® при онкологических заболеваниях?	6
Когда нельзя применять препарат КЕЙТРУДА®?	8
До начала лечения препаратом КЕЙТРУДА®	8
Нто вы должны знать о своем лечении	11
1. Каким образом будет применяться препарат КЕЙТРУДА®?	11
2. Возможные побочные эффекты	12
Важно замечать и распознавать признаки или симптомы болезнибольствать признаки или симптомы болезни	16
Нто делать, если симптомы возникли в то время, когда вы находитесь вне дома или в отъезде?	17
Беременность и кормление грудью	18
Способность к вождению транспортного средства и управлению механизмами	18
Нто еще вы можете сделать для содействия терапии?	19
С кем вы можете поговорить о своем заболевании?	22
Дальнейшая информация	24

Hanucaнue с учетом пола не используется исключительно для удобства чтения. Поэтому все персонализированные понятия следует понимать как гендернонейтральные.

Введение

Врач назначил вам препарат КЕЙТРУДА® (пембролизумаб). Эта брошюра предназначена для использования в качестве руководства, ее цель – информировать вас об иммунотерапии данным препаратом.

Из этой брошюры вы узнаете, как действует препарат КЕЙТРУДА® и что необходимо учитывать во время терапии. Дается описание побочных эффектов, которые могут возникнуть во время лечения, и объясняется, как их распознать. Вы также узнаете, почему важно немедленно сообщать врачу о любых симптомах болезни, что еще вы можете сде-

лать, чтобы помочь терапии, и с кем можно поговорить о своем заболевании.


В конце брошюры содержатся интернет-адреса для получения дополнительной информации, которая может быть для вас полезна.



Как действует препарат КЕЙТРУДА® при онкологических заболеваниях?

Назначенный вам препарат относится к так называемым средствам иммунотерапии рака (ингибиторы контрольных точек иммунного ответа). Этот тип лекарственных препаратов помогает собственной иммунной системе организма, усиливая имеющуюся у нее способность бороться с раковыми клетками, которая подавлена в результате действия определенных механизмов. Этот лекарственный препарат является так называемым антителом. Антитело — это белковая молекула, которая может очень специфично распознавать определенную мишень и связываться с ней. КЕЙТРУДА® (пембролизумаб) связывается с клетками иммунной системы, так называемыми Т-клетками, и таким образом позволяет им снова начать распознавать раковые клетки и бороться с ними.

Как действует терапия?




1

На поверхности Т-клеток имеется, помимо прочего, специфический рецептор, а на поверхности собственных клеток организма – соответствующий лиганд. Рецептор и лиганд подходят друг к другу, как ключ к замку. При встрече Т-клетки с

клеткой организма лиганд связывается с рецептором. Это предотвращает беспричинную атаку Т-клетки на клетку организма (аутоиммунная реакция).




При определенных обстоятельствах раковые клетки могут использовать именно этот механизм, вырабатывая именно такой лиганд. Если они встречаются с Т-клеткой, лиганд связывается с рецептором Т-клетки и таким образом инактивирует ее.



3

Пембролизумаб – антитело, которое, связываясь с рецептором Т-клетки, блокирует его, таким образом предотвращая эту инактивацию.



Т-клетки снова способны распознавать и уничтожать раковые клетки.



Таким образом терапия повышает иммунный ответ организма для борьбы с раком.

Когда нельзя применять препарат КЕЙТРУДА®



Препарат КЕЙТРУДА® нельзя применять при выявленной гиперчувствительности или аллергии на действующее вещество пембролизумаб или другие компоненты этого препарата (L-гистидин, L-гистидина гидрохлорида моногидрат, сахароза, полисорбат 80). Сообщите своему лечащему врачу обо всех выявленных у вас аллергических реакциях, чтобы он мог распознать возможную непереносимость.

Препарат также не следует применять у детей и подростков до 18 лет, за исключением детей и подростков в возрасте 3 лет и старше с классической лимфомой Ходжкина, а также детей и подростков в возрасте 12 лет и старше с меланомой.

До начала лечения препаратом КЕЙТРУДА®

Вы должны сообщить своему врачу, если вы принимаете другие лекарственные средства, ослабляющие вашу иммунную систему. К ним относятся, например, кортикостероиды, такие как преднизон. Эти лекарственные средства могут ослаблять действие препарата КЕЙТРУДА®. Однако если вы уже получаете лечение препаратом КЕЙТРУДА®, врач может назначить вам кортикостероиды, чтобы уменьшить возможные побочные эффекты. Также кортикостероиды могут быть назначены вам до того, как вы начнете

получать препарат КЕЙТРУДА® в сочетании с химиотерапией – для предотвращения и/ или купирования тошноты, рвоты и других побочных эффектов, вызванных химиотерапией.

Сообщите своему врачу, если вы применяете или принимаете другие лекарства, недавно их применяли или принимали либо собираетесь их применять или принимать.

Кроме того, важно, чтобы вы сообщили, если:

у вас аутоиммунное заболевание (заболевание, при котором организм атакует свои собственные клетки).

у вас воспаление легких (пневмония) или другое воспалительное заболевание легких (так называемый пневмонит).

ранее вы получали ипилимумаб (другое лекарство для лечения определенных типов рака) и от этого лекарства у вас имелись тяжелые побочные эффекты.

при лечении другими моноклональными антителами у вас возникала аллергическая реакция.

у вас имеется или была хроническая вирусная инфекция печени, включая гепатит В (HBV) или гепатит С (HCV).

вы инфицированы «вирусом иммунодефицита человека» (ВИЧ) или у вас «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД).

у вас поражена печень.

у вас поражены почки.

вам была сделана трансплантация органа или костного мозга с пересадкой донорских стволовых клеток (аллогенная трансплантация стволовых клеток).

вы беременны, предполагаете, что беременны или планируете забеременеть.

вы кормите или планируете кормить грудью.



Если вы женщина детородного возраста, то во время лечения препаратом КЕЙТРУДА® и в течение как минимум четырех месяцев после последнего введения препарата вы должны использовать надежный метод контрацепции.



Что вы должны знать о своем лечении

1Каким образом будет применяться препарат КЕЙТРУДА®?

Вы будете получать препарат КЕЙТРУДА® в больнице или амбулаторно под наблюдением врача, который имеет опыт в лечении рака.



Рекомендуемая доза препарата для взрослых составляет либо 200 мг каждые 3 недели, либо 400 мг каждые 6 недель.



Рекомендуемая доза препарата для детей и подростков в возрасте 3 лет и старше с классической лимфомой Ходжкина или детей и подростков в возрасте 12 лет и старше с меланомой составляет 2 мг/кг массы тела (максимум до 200 мг) каждые 3 недели.



Препарат вводится в виде инфузии в вену (внутривенно) в течение примерно 30 минут. Решение о том, сколько инфузий препарата вам необходимо, принимает ваш врач.

Иногда в течение первых нескольких месяцев опухоль может увеличиваться, прежде чем она начнет уменьшаться, либо могут появиться новые опухоли. Если после начала лечения препаратом КЕЙТРУДА® состояние вашей опухоли поначалу (якобы) ухудшилось, то при условии стабильного состояния здоровья врач может продолжить лечение. Он повторно обследует вас, чтобы выяснить, поддается ли ваша болезнь лечению.



КЕЙТРУДА® может применяться в сочетании с другими лекарственными средствами для лечения рака. Важно, чтобы вы также ознакомились с инструкциями по применению других лекарственных средств. Если у вас есть какие-либо вопросы об этих лекарствах, обратитесь к своему врачу.

Важно приходить на прием к врачу в соответствии с назначенными визитами, чтобы врач мог контролировать ход вашего лечения.

Если вы не можете явиться на визит к врачу, немедленно сообщите ему об этом, чтобы был назначен новый визит. Очень важно не пропускать лечение препаратом КЕЙТРУ-ДА®. Если прекратить лечение, этот препарат может перестать действовать. Не прекращайте лечение препаратом КЕЙТРУДА®, не обсудив это предварительно со своим врачом.

2 Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные препараты, КЕЙТРУДА® может вызывать побочные эффекты, которые, однако, возникают не у всех. При приеме этого лекарственного препарата у вас могут возникнуть некоторые тяжелые побочные эффекты. Побочные эффекты иногда могут представлять угрозу для жизни и приводить к смертельному исходу. Эти побочные эффекты могут возникнуть в любое время во время лечения или даже после окончания лечения. У вас может возникнуть несколько побочных эффектов одновременно. Очень важно, чтобы во время лечения вы сообщали своему врачу о любых симптомах болезни. Для того чтобы предотвратить более серьезные осложнения и облегчить симптомы, врач может назначить вам вспомогательные лекарственные препараты. Врач может перенести следующую инфузию препарата на более поздний срок или прервать ваше лечение. Терапию препаратом КЕЙТРУДА® можно возобновить в течение 12 недель после последнего введения препарата при определенных условиях. Ваш врач сообщит вам об этом.

Немедленно сообщите своему врачу, если вы заметили любой из следующих признаков или других симптомов:

Побочные эффекты	Признак или симптом
Заболевания легких (воспаление легких)	ОдышкаБоль в грудной клеткеКашель
Заболевания кишечника (воспаление кишечника)	 Диарея (понос), ненормально частый стул Темный, дегтеобразный, липкий стул, в котором может содержаться кровь или слизь Сильная боль или болезненность при надавливании на живот Тошнота или рвота

Побочные эффекты	Признак или симптом		
Заболевания печени (воспаление печени)	 Тошнота или рвота Снижение чувства голода Боль справа в желудке или животе Пожелтение кожи или глазных яблок Потемнение мочи Легко возникающие кровотечения или образование синяков 		
Заболевания почек (воспаление почек)	• Изменение количества и цвета мочи		
Заболевания эндокринных желез (воспаление желез внутренней секреции, прежде всего щитовидной железы, гипофиза, надпочечников)	 Учащенное сердцебиение Снижение или увеличение веса Повышенное потоотделение Выпадение волос Ощущение холода Запоры Понижение голоса Мышечная боль Головокружение или обморок Длительная или необычная головная боль 		
Диабет 1 типа, включая диабетический кетоацидоз (повышенная кислотность крови, вызванная диабетом)	 Повышенное чувство голода или жажды Потребность в частом мочеиспускании Потеря веса Чувство усталости или тошноты Боль в животе Учащенное и углубленное дыхание Спутанность сознания Ненормальная сонливость Сладковатый запах изо рта Сладковатый или металлический привкус во рту Изменение запаха мочи или пота. 		



Примечание: список побочных эффектов, зарегистрированных во время лечения препаратом КЕЙТРУДА®, содержится в инструкции по применению.

Нарушения в работе других органов

Побочные эффекты	Признак или симптом
Воспаление глаз (увеит)	• нарушения зрения
Воспаление мышц (миозит)	• боль или слабость в мышцах
Воспаление сердечной мышцы (миокардит)	• одышка, нерегулярное сердцебиение, чувство усталости или боль в груди.
Воспаление поджелудочной железы (панкреатит)	• боль в животе, тошнота и рвота
Воспаление кожи	• сыпь, зуд, образование волдырей, шелушение кожи или образование кожных язв и/или язв во рту или на слизистой оболочке носа, горла или в области половых органов
Заболевание иммунной системы (саркоидоз)	• может поражать легкие, кожу, глаза и/или лимфатические узлы
Воспаление головного мозга (энцефалит)	• спутанность сознания, лихорадка, нарушения памяти или приступы судорог
Воспаление сосудов (васкулит)	• боль в суставах, лихорадка, ночная потливость и потеря веса
Воспаление спинного мозга (миелит)	• боль, онемение, покалывание или слабость в руках или ногах; нарушение работы мочевого пузыря или кишечника, включая потребность в частом мочеиспускании, атонию мочевого пузыря (недержание мочи), затрудненное мочеиспускание и запор
Воспаление мочевого пузыря (неинфекционный цистит)	 частое и/или болезненное мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию, кровь в моче, боль или чувство давления в нижней части живота
Воспаление и рубцевание желчных протоков (склерозирующий холангит)	• боль справа в верхней части живота/желудка, отек печени или селезенки, чувство утомленности/усталости, зуд или пожелтение кожи или глазных яблок

Побочные эффекты	Признак или симптом
Воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит)	 тошнота, рвота, боль в верхней части живота, чувство распирания, потеря аппетита или неприятный запах изо рта
Воспаление суставов (артрит)	• боль, отек, гипертермия и ограничение подвижности пораженных суставов в покое, покраснение, лихорадка
Воспаление нервов (синдром Гийена-Барре)	 мышечная слабость вплоть до развития паралича
Нарушение передачи сигнала между мышцами и нервами (миастенический синдром)	• мышечная слабость
Малокровие (гемолитическая анемия)	• бледность, чувство усталости, головокружение, пожелтение кожи
Снижение функции паращитовидной железы (гипопаратиреоз)	• Мышечные судороги или спазмы, усталость/ чувство слабости
Инфузионные реакции	• одышка• зуд или сыпь• головокружение или лихорадка

Осложнения, включая реакцию «трансплантат против хозяина» (РТПХ), у пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток костного мозга (аллогенная трансплантация стволовых клеток)

Это могут быть тяжелые осложнения, которые могут привести к смерти. Они могут возникнуть, если вам уже делали такую трансплантацию в прошлом или сделают ее

в будущем. Врач будет наблюдать за вами на предмет появления признаков и симптомов, таких как кожная сыпь, воспаление печени, боль в животе или диарея.



Если вы заметили какие-либо побочные эффекты, в том числе те, которые здесь не перечислены, обратитесь к врачу.

Важно замечать и распознавать признаки и/или симптомы болезни

Если во время применения препарата КЕЙ-ТРУДА® (пембролизумаб) вы заметите какие-либо симптомы, немедленно проконсультируйтесь со своим врачом. Пожалуйста, учитывайте, что побочные эффекты могут также возникать после последнего введения препарата. Даже если не все ваши симптомы связаны с применением препарата, предоставленная вами информация даст возможность врачу выявить побочные эффекты. Поэтому ваша помощь крайне важна.

Для того чтобы предотвратить более серьезные осложнения и облегчить симптомы, врач может назначить вам другие лекарственные препараты. Врач может перенести следующую инфузию препарата на более поздний срок или прервать ваше лечение.

Если из-за побочных эффектов врач прервал лечение, то после исчезновения побочных эффектов терапия может быть возобновлена в течение12 недель после последнего введения препарата КЕЙТРУДА®.

Для уменьшения возможных побочных эффектов во время лечения препаратом КЕЙТРУДА® врач может назначить вам кортикостероиды («кортизон»). Также кортикостероиды могут быть назначены вам до того, как вы начнете получать препарат в сочетании с химиотерапией – для предотвращения и/или купирования тошноты, рвоты и других побочных эффектов, вызванных химиотерапией.

Если вы обнаружили у себя побочные эффекты, немедленно обратитесь к своему врачу. Это также относится к побочным эффектам, которые не указаны в данной брошюре или инструкции по применению.

Не пытайтесь сами диагностировать или лечить свои побочные эффекты.

Если прекратить лечение, препарат может перестать действовать. Не прекращайте лечение препаратом КЕЙТРУДА®, не обсудив это предварительно со своим врачом. Если у вас есть дополнительные вопросы по поводу применения этого препарата, обратитесь к своему врачу.

Если вы пропустили введение препарата, немедленно обратитесь к врачу, чтобы компенсировать пропущенное введение. Очень важно не пропускать лечение этим препаратом.



Что делать, если симптомы возникли в то время, когда вы находитесь вне дома или в отъезде?

При возникновении симптомов важно сразу же сообщить о них своему врачу. Всегда носите с собой содержащую контактные данные вашего врача карточку пациента, получающего лечение препаратом КЕЙ-ТРУДА®, для того чтобы в случае необходимости с ним можно было связаться.

В карточке пациента содержатся важные сведения о признаках или симптомах болезни, о возникновении которых необходимо немедленно сообщать врачу или медицинскому персоналу, если вы находитесь в отъезде. В ней также содержится информация для других врачей о том, что вы получаете лечение препаратом КЕЙТРУДА®.



Если у вас есть вопросы по поводу препарата КЕЙТРУДА® или механизма его действия, обратитесь к своему врачу.

Беременность и кормление грудью



Если вы беременны, предполагаете, что беременны, планируете забеременеть или забеременели во время получения лечения препаратом КЕЙТРУДА®, немедленно сообщите об этом своему врачу. Этот препарат может причинить вред или привести к смерти вашего будущего ребенка. Во время получения терапии и в течение не менее четырех месяцев после последнего введения препарата женщины детородного возраста должны использовать надежный метод контраиепиии.

Если вы кормите грудью или планируете кормить грудью, посоветуйтесь со своим врачом. Во время применения препарата

КЕЙТРУДА® вам нельзя кормить грудью. Неизвестно, может ли этот препарат проникать в грудное молоко.

Способность к вождению транспортного средства и управлению механизмами

КЕЙТРУДА® оказывает незначительное влияние на способность к вождению транспортного средства и управлению механизмами. Возможными побочными эффектами лекарства являются головокружение, усталость

или слабость. После инфузии препарата не садитесь за руль и не управляйте механизмами, пока не убедитесь, что чувствуете себя хорошо.

Что еще вы можете сделать для содействия терапии?

В принципе можно сказать, что все, что улучшает ваше самочувствие, также содействует терапии. Например, здоровый образ жизни со сбалансированной диетой, достаточной физической активностью и свежим воздухом, отказ от никотина и алкоголя являются мерами, с помощью которых вы можете укрепить себя физически и морально для содействия лечению.



Рекомендуется разнообразная, полноценная диета, обеспечивающая организм достаточным количеством необходимых питательных веществ. Это также включает прием достаточного количества жидкости. Специальной «противораковой диеты» не существует. Однако в определенных ситуациях, например, во время химиотерапии, после некоторых операций или при ослаблении иммунной системы, может потребоваться корректировка диеты.

Немецкая организация помощи больным раком выпустила брошюру «Питание при раке – Синие справочники 46». Вы можете получить ее у своего врача, скачать из Интернета* или заказать непосредственно в Немецкой организации помощи больным раком. В брошюре содержится множество практических советов для особых ситуаций. Научно доказано, что физическая актив-

ность и спорт положительно влияют на течение заболевания. С другой стороны, слишком длительный отдых может привести к вторичным заболеваниям, таким как ослабление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Если вы в настоящее время не можете заниматься спортом из-за болезни или лечения, вы не должны из-за этого испытывать чувство вины. Просто совершите неторопливую прогулку в одиночку или с собакой или короткую поездку на велосипеде. Как только вы заметите, что снова стали сильнее, вы можете увеличить свою активность. Однако предварительно проконсультируйтесь с врачом. Он может предоставить вам информацию о вашей физической форме и пригодности к занятиям спортом и, возможно, составить вместе с вами индивидуальную программу для физической активности.



Общие рекомендации по питанию

- Разделите свою суточную потребность не менее чем на пять приемов пищи.
- Ешьте спокойно и медленно, хорошо пережевывайте пищу.
- Следите за тем, чтобы еда и напитки были не слишком горячими и не слишком холодными.
- Избегайте продуктов, которые вы не переносите.
- Следите за тем, чтобы ваше питание было разнообразным и вы получали достаточное количество питательных веществ.

 $[*] https://www.krebshilfe.de/infomaterial/Blaue_Ratgeber/Ernaehrung-bei-Krebs_BlaueRatgeber_DeutscheKrebshilfe.pdf$



Имеется также брошюра Немецкой организации помощи больным раком «Упражнения и спорт при раке – Синие справочники 48», которая посвящена спорту и физическим упражнениям и содержит подробную информацию и рекомендации по упражнениям при различных видах рака.**

В дополнение к традиционной медицине некоторые пациенты хотели бы воспользоваться методами комплементарной и альтернативной медицины. Комплементарные виды лечения являются частью научной медицины. Они могут применяться в качестве дополнения к традиционной терапии рака.



Альтернативные методы и средства лечения, как правило, являются спорными с медицинской точки зрения и обычно их эффективность научно не доказана. Важно, чтобы перед началом такой терапии вы обязательно проинформировали об этом своего врача.

^{**} https://www.krebshilfe.de/infomaterial/Blaue_Ratgeber/Bewegung-und-Sport-bei-Krebs_BlaueRatgeber_ DeutscheKrebshilfe.pdf

С кем вы можете поговорить о своем заболевании?

Диагноз «рак» вызывает у пациентов множество вопросов. Обсудить и уточнить с вами любые медицинские вопросы может ваш лечащий врач. Если у вас есть вопросы о том, как справляться с болезнью или повседневной жизнью, вам может оказать пользу и поддержку психоонкологическая консультация. Психоонкология является частью онкологии, иногда ее также называют «психосоциальной онкологией». Здесь совместно работают врачи, психотерапевты, психологи, социальные работники, педагоги, представители художественной терапии, средний медицинский персонал, физиотерапевты, эрготерапевты и пасторы. Они проконсультируют вас по бытовым вопро-

сам, расскажут о социальных льготах и предложат помощь при психологических проблемах. таких депрессия как тревожность. Психоонкологическое консультирование может проводиться как в стационаре, так и амбулаторно. Услуги предоставляются, например, в больницах, реабилитационных клиниках, онкологических консультационных центрах или в специализированных медицинских онкологических практиках. Найти подходящее место вам может помочь ваш врач. Дополнительная информация по этим вопросам и контактные адреса содержатся также в немецком руководстве для пациентов «Психоонкология»*.





Какие бы вопросы у вас ни возникли, какие бы проблемы вас ни волновали или обременяли, помните:

вы не должны решать свои проблемы в одиночку!

Многие пациенты считают полезным поговорить с другими людьми, затронутыми такой же болезнью. Группы самопомощи представляют собой компетентную платформу для пациентов и их родственников. Ваш врач может помочь вам найти группу самопомощи в вашем районе.

Люди с онкологическими заболеваниями имеют право на специальные социальные льготы, такие как пособие по болезни, пенсия, поддержка в соответствии с законом о людях с тяжелой формой инвалидности, а также покрытие расходов на лечение, реабилитационные услуги и уход на дому. Немецкая организация помощи больным раком выпустила посвященную этому брошюру под названием «Руководство по социальным льготам». Вы можете также обра-



титьсянепосредственновконсультационные центры социальных услуг, которые сейчас имеются во многих клиниках и центрах, в компании медицинского страхования, компании пенсионного страхования, общественные объединения, учреждения социального обеспечения, ведомства по социальным вопросам и агентства по трудоустройству.

 $^{*\} https://www.krebshilfe.de/infomaterial/Patientenleitlinien/Psychoonkologie_Patientenleitlinie_Deutsche Krebshilfe.pdf$

^{**} https://www.krebshilfe.de/infomaterial/Blaue_Ratgeber/Wegweiser-zu-Sozialleistungen_BlaueRatgeber_ DeutscheKrebshilfe.pdf

Дальнейшая информация



Дополнительная информация о видах рака, их лечении, обследованиях и повседневной жизни больных раком содержится на сайте Службы информирования о раке Немецкого центра исследования рака (DKFZ) при Объединении имени Гельмгольца: www.krebsinformationsdienst.de





Сведения о праве на социальные пособия, такие как пособие по болезни, пенсия или пособие для реабилитации, содержатся в брошюре «Путеводитель по социальным пособиям»:

www.krebshilfe.de/fileadmin/Downloads/PDFs/Blaue Rataeber/040 0048.pdf

Нейтральную и независимую информацию о диагностике, лечении и послеоперационном уходе при онкологическом заболевании можно получить у сотрудников информационно-консультационной службы INFONETZES KREBS Немецкой организации помощи больным раком: https://www.infonetz-krebs.de/





Дополнительная информация об иммунотерапии и механизме действия препарата КЕЙТРУДА® содержится по адресу:

www.msd-gesundheit.de/immunonkologie/therapie/

Сообщение о побочных эффектах

Вы можете сообщить о побочных эффектах непосредственно в компанию MSD или Институт имени Пауля Эрлиха:

MSD Sharp & Dohme GmbH

Abt. Arzneimittelsicherheit Levelingstr. 4a, 81673 München Факс: + 49 89 45 61 - 1352

эл. почта: arzneimittelsicherheit@msd.de

Paul-Ehrlich-Institut

Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen

Тел: +49 6103 77 0 Факс: +49 6103 77 1234

www.pei.de

Сообщая о побочных эффектах, вы помогаете получить больше информации о безопасности этого лекарственного препарата.



Вопросы для вашего следующего визита к врачу:					

Bei dieser Information handelt es sich um eine nichtamtliche Übersetzung der beauflagten deutschsprachigen Unterlagen durch ein zertifiziertes Übersetzungsbüro.

Данная информация является неофициальным переводом с немецкого языка заказанных документов, выполненным сертифицированным бюро переводов.

MSD Infocenter Tel. 0800 673 673 673 Fax 0800 673 673 329 E-Mail infocenter@msd.de

