

Patientenkarte zur sicheren Anwendung



▼ WELIREG (Belzutifan)

- Nehmen Sie WELIREG nicht zur Behandlung des von Hippel-Lindau-Syndroms ein, wenn Sie schwanger sind.
- Wenn Sie schwanger sind und eine Behandlung aufgrund eines Nierenzellkarzinoms (*Renal Cell Carcinoma, RCC*) benötigen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Anwendung von WELIREG.
- WELIREG kann dem Baby schaden und eine Fehlgeburt verursachen. Wenn Sie schwanger sind, vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.



70119776/00-1/
5331

- Ihr Arzt wird einen Schwangerschaftstest durchführen, bevor Sie mit der Einnahme von WELIREG beginnen.
- Während Sie WELIREG einnehmen, dürfen Sie nicht schwanger werden.

Empfängnisverhütung (Kontrazeption)

Frauen im gebärfähigen Alter:

- Verhütungsmethoden, die Hormone enthalten, wie Antibabypillen, Injektionen oder transdermale Pflaster, wirken möglicherweise nicht so gut, während Sie WELIREG einnehmen.
- Während Sie WELIREG einnehmen und für mindestens 1 Woche nach Ihrer letzten Dosis
 - müssen Sie eine wirksame Form der nicht-hormonellen Empfängnisverhütung (Kontrazeption) anwenden oder
 - Ihr männlicher Partner muss ein Kondom anwenden.

- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker über geeignete Verhütungsmethoden, die Sie anwenden können, während Sie WELIREG einnehmen.
- Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie während der Behandlung schwanger werden oder vermuten, schwanger zu sein.

Für weitere Informationen lesen Sie die Packungsbeilage zu WELIREG. Diese enthält Informationen für Patienten.

Wichtige Kontaktinformationen

Name des Arztes _____

Telefonnummer
der Praxis _____

Telefonnummer
außerhalb der
Praxiszeiten _____

Mein Name _____