

Patientenkarte zur sicheren Anwendung



**Wichtige Informationen
für Frauen im gebärfähigen
Alter**

WELIREG (Belzutifan)

Während Sie WELIREG einnehmen, dürfen Sie nicht schwanger werden.

Wenn Sie schwanger sind:

- Nehmen Sie WELIREG nicht zur Behandlung des von Hippel-Lindau-Syndroms ein.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bezüglich der Anwendung von WELIREG zur Behandlung eines Nierenzellkarzinoms.



70126111/00-1
5331

- WELIREG kann dem Ungeborenen schaden und eine Fehlgeburt verursachen.
- Sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt, wenn Sie schwanger sind, vermuten, schwanger zu sein, schwanger werden oder beabsichtigen, schwanger zu werden – sowohl bevor als auch während der Behandlung mit WELIREG.
- Ihr Arzt wird einen Schwangerschaftstest durchführen, bevor Sie mit der Einnahme von WELIREG beginnen.

Kontrazeption (Empfängnisverhütung)

- Verhütungsmethoden, die Hormone enthalten, wie Antibabypillen, Injektionen oder transdermale Pflaster, können während der Einnahme von WELIREG weniger wirksam sein.

- Verwenden Sie eine zuverlässige nicht-hormonelle Verhütungsmethode oder lassen Sie Ihren männlichen Partner ein Kondom benutzen, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Dies gilt während Sie WELIREG einnehmen und für mindestens 1 Woche nach der letzten Dosis.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker über geeignete Verhütungsmethoden, die Sie anwenden können.

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, um weitere Informationen zu erhalten.

Wichtige Kontaktdaten

Mein Name _____

Name meines Arztes _____

Telefonnummer
der Praxis _____